


MJERNA STANICA: Pofalići**PERIOD: 13.05. - 19.05.2022.****Koncentracija polena:**

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 1197 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Pinaceae* (517 pol. zr/m³ ili 43,19%), *Betula* (230 pol. zr/m³ ili 19,21%), *Carpinus* (184 pol. zr/m³ ili 15,37%), *Tax/Jun* (136 pol. zr/m³ ili 11,36%), *Fagus* (97 pol. zr/m³ ili 8,10%), i *Juglans* (33 pol. zr/m³ ili 2,76%).

**TREND POLENA**

Tokom protekle sedmice konstatovane su umjerene do visoke koncentracije polena drveća (1197 pol. zr/m³ zraka) i to: borova, breze, graba, tise, čempresa, bukve i oraha.

Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Visoke koncentracije polen utvrđene su 12.05. (četvrtak), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u subotu (14.05.2022).



Pinaceae (borovi)


Betula (breza)

Taxus (tise)

Cupressus (čempresi)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergenih biljaka

**Prognoza, savjeti i preporuke:**

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem fenologije biljaka u KS proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar, tokom naredne sedmice može se očekivati blagi pad polena drveća.

Osobama koje su alergične na polen drveća preporučuje se da tokom proljeća (u vrijeme cvjetanja drveća), što više vremena provode u visokoplanskom području, odnosno iznad granice šume.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA								
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet
Datum	13.05.	14.05.	15.05.	16.05.	17.05.	18.05.	19.05.	zr/m ³
DRVEĆE								
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)	XX	230						
Carpinus (grab)	XX	X	XX	XX	XX	XX	XX	184
Castanea (pitomi kesten)
Corylus (lijeska)
Fagus (bukva)	X	X	X	X	X	XX	XX	97
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)	.	X	X	.	X	.	X	33
Pinaceae (borovi)	XX	XX	XXX	XX	XX	XX	X XX	517
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)	XX	XX	X	X	X	XX	XX	136
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća	148	125	193	143	161	183	244	1197
Trava								
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šaševi)
Ukupno polena trave	0							
KOROVI								
Ambrosia (ambrozija)
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)
Chenopodiaceae (lobodnjače)
Ukupno polena korova	0							
Sedmično variranje polena	148	125	193	143	161	183	244	1197
UKUPNO pol. zr/m³								

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)					
POLENSKA SKALA	drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod	
X niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba
XX umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba
XXX visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXXX jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetra i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suzenja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergenih biljaka.