

MJERNA STANICA: Pofalići

PERIOD: 27.05. - 02.06.2022.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 705 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Pinaceae* (339 pol. zr/m³ ili 48,09%), *Poaceae* (136 pol. zr/m³ ili 19,29%), *Betula* (60 pol. zr/m³ ili 8,51%), *Fagus* (51 pol. zr/m³ ili 7,23%) *Carpinus* (43 pol.zr/m³ ili 6,10%), *Tax/Jun* (43 pol. zr/m³ ili 6,10%), i *Juglans* (33 pol. zr/m³ ili 4,68%).



DRVEĆE

569 zr/m³



TRAVE

136 zr/m³



KOROVI

0 zr/m³

TREND POLENA

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske do umjerene koncentracije polena drveća (569 pol. zr/m³ zraka) i umjerene do visoke koncentracije polena trava (136 pol. zr/m³ zraka).

Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Visoke koncentracije polen utvrđene su 01.06. (srijeda), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u petak (27.05.2022).



Pinaceae (borovi)



Betula (breza)




Taxus (tise)



Cupressus (čempresi)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergernih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem fenologije biljaka u KS proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar, tokom naredne sedmice može se očekivati blagi pad polena drveća.

Osobama koje su alergične na polen drveća preporučuje se da tokom proljeća (u vrijeme cvjetanja drveća), što više vremena provode u visokoplaninskom području, odnosno iznad granice šume.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
	Datum	27.05.	28.05.	29.05.	30.05.	31.05.	01.06.	02.06.	zr/m ³
DRVEĆE									
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)	X	X	X	X	X	X	X	X	60
Carpinus (grab)	X	X	X	X	X	.	X	.	43
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)	X	X	X	X	X	X	X	X	51
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)	X	X	X	X	X	.	X	X	33
Pinaceae (borovi)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	339
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)	X	X	X	X	X	X	X	X	43
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća	69	83	75	79	77	96	90	569	
POACEAE (TRAVE)									
Poaceae (trave)	XX	XX	XX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	136
Cyperaceae (šišaševi)
Ukupno polena trava	18	11	19	17	21	26	24	136	
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)
Chenopodiaceae (lobodnjače)
Ukupno polena korova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedmično variranje polena	87	94	94	96	98	122	114	705	
UKUPNO pol. zr/m³									705

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m³)

POLENSKA SKALA		drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod	
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjeren koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergičnih biljaka.