

## MJERNA STANICA: Pofalići

PERIOD: 08.07. - 14.07.2022.

### Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 706 pol. zr/m<sup>3</sup>. Polen pripada skupini drveća, trava i korova. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Urticaceae* (262 pol. zr/m<sup>3</sup> ili 37,11%), *Poaceae* (230 pol. zr/m<sup>3</sup> ili 32,58%), *Asteraceae* (89 pol. zr/m<sup>3</sup> ili 12,61%), *Plantaginaceae* (64 pol. zr/m<sup>3</sup> ili 9,07%), *Tilia* (35 pol. zr/m<sup>3</sup> ili 4,96%) i *Pinaceae* (26 pol. zr/m<sup>3</sup> ili 3,68%).

DRVEĆE	TRAVE	KOROVI
61 zr/m <sup>3</sup>	230 zr/m <sup>3</sup>	415 zr/m <sup>3</sup>

### TREND POLENA!!!

Tokom protekле sedmice konstatovane su niske koncentracije polena drveća (61 pol. zr/m<sup>3</sup>), visoke koncentracije polena trava (230 pol. zr/m<sup>3</sup>) i niske do visoke koncentracije polena korova (415 pol. zr/m<sup>3</sup>). Polen drveća i polen trava je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Visoke koncentracije polena utvrđene su 13.07. (srijeda), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u petak (08.07.2022).



Pinaceae (borovi)



Poaceae (trave)




Poaceae (trave)



Poaceae (trave)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m<sup>3</sup>) u toku sedmice

% udio polena alergenih biljaka



### Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem fenologije biljaka u KS proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar, tokom naredne sedmice može se očekivati blagi pad polena drveća i povećanje polena trava i korova. Osobama koje su alergične na polen trava preporučuje se šetnja u parkovima ili u šumskim ekosistemima.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA								
Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
Datum	08.07.	09.07.	10.07.	11.07.	12.07.	13.07.	14.07.	zr/m <sup>3</sup>
<b>DRVEĆE</b>								
Acer (javor)	.	.	.	.	.	.	.	.
Aesculus (divlji kesten)	.	.	.	.	.	.	.	.
Alnus (joha)	.	.	.	.	.	.	.	.
Betula (breza)	.	.	.	.	.	.	.	.
Carpinus (grab)	.	.	.	.	.	.	.	.
Castanea (pitomi kesten)	.	.	.	.	.	.	.	.
Coryllus (lijeska)	.	.	.	.	.	.	.	.
Fagus (bukva)	.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus (jasen)	.	.	.	.	.	.	.	.
Juglans (orah)	.	.	.	.	.	.	.	.
Pinaceae (borovi)	X	X	X	X	X	.	X	26
Platanus (platan)	.	.	.	.	.	.	.	.
Populus (topola)	.	.	.	.	.	.	.	.
Quercus (hrast)	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix (vrba)	.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus (zova)	.	.	.	.	.	.	.	.
Tax/Jun (tisa/čempres)	.	.	.	.	.	.	.	.
Tilia (lipa)	X	X	X	X	X	X	X	35
Ulmus (brijest)	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Ukupno polena drveća</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>61</b>
<b>TRAVA</b>								
Poaceae (trave)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	230
Cyperaceae (šaševi)	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Ukupno polena trave</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>230</b>
<b>KOROVI</b>								
Ambrosia (ambrozija)	.	.	.	.	.	.	.	.
Artemisia (pegin)	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex (kiselica)	.	.	.	.	.	.	.	.
Urticaceae (žare)	XX	XX	XX	XX	XX	XXX	XX	262
Asteraceae (glavočike)	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	89
Plantaginaceae (bokvice)	X	XX	X	X	X	XX	XX	64
Chenopodiaceae (lobodnjače)	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Ukupno polena korova</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>66</b>	<b>415</b>
<b>Sedmično variranje polena</b>	<b>73</b>	<b>98</b>	<b>111</b>	<b>94</b>	<b>112</b>	<b>120</b>	<b>98</b>	<b>706</b>
<b>UKUPNO pol. zr/m<sup>3</sup></b>								

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m <sup>3</sup> )					
POLENSKA SKALA		drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10 izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50 puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500 većine alergičnih osoba
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500 svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

#### NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetra i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suzenja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergenih biljaka.