

MJERNA STANICA: Pofalići


PERIOD: 07.10. – 07.10.2022.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 132 pol. zr/m³. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Urticaceae* (37 pol. zr/m³ ili 28,03%), *Ambrosia* (26 pol. zr/m³ ili 19,70%), *Artemisia* (23 pol. zr/m³ ili 17,42%), *Rumex* (15 pol. zr/m³ ili 11,36%), *Asteraceae* (12 pol. zr/m³ ili 9,09%), *Plantaginaceae* (12 pol. zr/m³ ili 9,09%), *Chenopodiaceae* (4 pol. zr/m³ ili 3,03%) i *Pinaceae* (3 pol. zr/m³ ili 2,27%).

POLEN ALARM!!!

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske koncentracije polena drveća (3 pol. zr/m³) i niske koncentracije polena korova (129 pol. zr/m³). Polen trave nije konstatovan tokom mjerenog perioda. Polen trave i korova je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo). Visoke koncentracije polena utvrđene su 11.10. (utorak), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u petak (07.10.2022).



Artemisia (pelin)



Poaceae (trave)





Poaceae (trave)



Poaceae (trave)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergernih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem fenologije biljaka u KS, tokom naredne sedmice očekuje se smanjenje alergernih biljaka. Osobama koje su alergične na polen korova preporučuje se šetnja u parkovima, te u šumskim ili visokoplaninskim ekosistemima.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
	Datum	07.10.	08.10.	09.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	zr/m ³
DRVEĆE									
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)
Carpinus (grab)
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)
Pinaceae (borovi)	X	.	3
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TRAVE									
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šiške)
Ukupno polena trava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)	X	X	X	X	X	X	X	X	26
Artemisia (pelin)	X	X	X	X	X	X	X	.	23
Rumex (kiselica)	.	.	X	.	X	X	X	X	15
Urticaceae (žare)	X	X	X	X	X	X	X	X	37
Asteraceae (glavočike)	.	.	X	.	X	X	X	.	12
Plantaginaceae (bokvice)	.	X	X	X	.	X	X	.	12
Chenopodiaceae (lobodnjače)	X	.	.	4
Ukupno polena korova	9	19	18	19	28	22	14	14	129
Sedmično variranje polena	9	19	18	19	28	25	14		132
UKUPNO pol. zr/m³									132

POLENSKA SKALA		KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)					Simptomi alergije se javljaju kod
		drveće	trave	korovi			
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba	
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba	
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba	
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba	

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergeni biljaka.