


MJERNA STANICA: Pofalići

PERIOD: 14.10. – 20.10.2022.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 132 pol. zr/m³. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: *Ambrosia* (48 pol. zr/m³ ili 36,36%), *Urticaceae* (30 pol. zr/m³ ili 22,73%), *Artemisia* (18 pol. zr/m³ ili 13,64%), *Asteraceae* (10 pol. zr/m³ ili 7,58%), *Rumex* (9 pol. zr/m³ ili 6,82%), *Chenopodiaceae* (9 pol. zr/m³ ili 6,82%) i *Plantaginaceae* (8 pol. zr/m³ ili 6,06%).



POLEN ALARM!!!

Tokom protekле sedmice nije konstatovan polen drveća, niti trave. Konstatoavane su niske koncentracije polena korova koji je i jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo). Visoke koncentracije polena utvrđene su 15.10. (subota), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u petak (14.10.2022).



Artemisia (pelin)



Poaceae (trave)




Poaceae (trave)



Poaceae (trave)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergenih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem fenologije biljaka u KS, tokom naredne sedmice očekuje se smanjenje polena alergenih biljaka. Osobama koje su alergične na polen korova preporučuje se šetnja u parkovima, te u šumskim ili visokoplaninskim ekosistemima.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA								
Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
Datum	14.10.	15.10.	16.10.	17.10.	18.10.	19.10.	20.10.	zr/m ³
DRVEĆE								
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)
Carpinus (grab)
Castanea (pitomi kesten)
Corylus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)
Pinaceae (borovi)
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća	0							
TRAVE								
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šaševi)
Ukupno polena trave	0							
KOROVI								
Ambrosia (ambrozija)	X	X	X	X	X	X	X	48
Artemisia (pelin)	X	X	X	X	.	X		18
Rumex (kiselica)	.	X	X	9
Urticaceae (žare)	X	X	X	X	X	X	X	30
Asteraceae (glavočike)	.	X	X	.	.	X	.	10
Plantaginaceae (bokvice)	.	.	.	X	X	.	.	8
Chenopodiaceae (lobodnjače)	.	.	X	X	.	.	.	9
Ukupno polena korova	13	28	21	16	14	22	18	132
Sedmično variranje polena	13	28	21	16	14	22	18	132
UKUPNO pol. zr/m³								

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m³)

POLENSKA SKALA	drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod
X niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10 izuzetno osjetljivih osoba
XX umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50 puno alergičnih osoba
XXX visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500 većine alergičnih osoba
XXXX jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetra i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suzenja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergenih biljaka.