

MJERNA STANICA: Pofalići

PERIOD: 13.04. - 19.04.2018.

Konzentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 5675 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: Betula (53,67%), Carpinus (18,23%), Fraxinus (16,17%), Pinaceae (0,37%) i Tax/Jun (11,56%).



DRVEĆE
5666 zr/m³

TRAVE
0 zr/m³

KOROVI
0 zr/m³

TREND POLENA!!! POLEN ALARM!!!

Tokom protekle sedmice konstatovane su umjerene do visoke koncentracije polena drveća (5666 pol. zr/m³ zraka) i to: breze, graba, jasena, borova, te tise i kleke. Polen drveća je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo). Visoke koncentracije polen utvrđene su 14.04. (subota), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u srijedu (18.04.2018).



Betula (breza)



Pinaceae (borovi)





Tax/Jun (tise/čempresi)



Fraxinus (jasen)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergernih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice može se očekivati pad polena drveća.

Osobama koje su alergične na polen drveća preporučuje se da tokom proljeća (u vrijeme cvjetanja drveća), što više vremena provode u visokoplaninskom području, odnosno iznad granice šume).

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
	Datum	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	zr/m ³
DRVEĆE									
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)
Alnus (joha)
Betula (breza)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3041
Carpinus (grab)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	1033
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	916
Juglans (orah)
Pinaceae (borovi)	X	X	X	X	21
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun (tisa/čempres)	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	655
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća		670	1376	1123	1336	471	269	421	5666
TRAVE									
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šišak)
Ukupno polena trava		0	0	0	0	0	0	0	0
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)
Chenopodiaceae (lobodnjače)
Ukupno polena korova		0	0	0	0	0	0	0	0
Sedmično variranje polena		670	1376	1123	1336	471	269	421	5666
									UKUPNO pol. zr/m³

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)						
POLENSKA SKALA			drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergičnih biljaka.