

MJERNA STANICA: Pofalići

PERIOD: 26.04. - 02.05.2019.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Pofalići konstatovano je 809 pol. zr/m³. Polen pripada skupini drveća. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: Betula (46,72%), Carpinus (16,93%), Juglans (4,94%), Pinaceae (14,96%), Tax/Jun (13,47%) i Aesculus (2,97%).



DRVEĆE
809 zr/m³



TRAVE
0 zr/m³



KOROVI
0 zr/m³

TREND POLENA!!!

Tokom protekle sedmice konstatovane su umjerene do visoke koncentracije polena drveća (809 pol. zr/m³ zraka) i to: breze, graba, oraha, borova, kestena, te tise i kleke. Polen drveća je jak alergjen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo). Visoke koncentracije polen utvrđene su 26.04. (petak), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u srijedu (01.05.2019).



Pinaceae (borovi)



Betula (breza)





Taxus (tise)



Cupressus (čempresi)

Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergernih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice može se očekivati blagi pad polena drveća.

Osobama koje su alergične na polen drveća preporučuje se da tokom proljeća (u vrijeme cvjetanja drveća), što više vremena provode u visokoplaninskom području, odnosno iznad granice šume.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
	Datum	26.07.	27.04.	28.04.	29.04.	30.04.	01.05.	02.05.	zr/m ³
DRVEĆE									
Acer (javor)
Aesculus (divlji kesten)	X	X	.	.	X	.	X	.	24
Alnus (joha)
Betula (breza)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	378
Carpinus (grab)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	137
Castanea (pitomi kesten)
Coryllus (lijeska)
Fagus (bukva)
Fraxinus (jasen)
Juglans (orah)	X	X	X	X	X	X	X	X	40
Pinaceae (borovi)	XX	XX	X	X	XX	XX	XX	XX	121
Platanus (platan)
Populus (topola)
Quercus (hrast)
Salix (vrba)
Sambucus (zova)
Tax/Jun	XX	X	X	XX	XX	X	XX	.	109
Tilia (lipa)
Ulmus (brijest)
Ukupno polena drveća		167	114	105	99	96	94	134	809
TRAVE									
Poaceae (trave)
Cyperaceae (šiške)
Ukupno polena trava		0	0	0	0	0	0	0	0
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)
Artemisia (pelin)
Rumex (kiselica)
Urticaceae (žare)
Asteraceae (glavočike)
Plantaginaceae (bokvice)
Chenopodiaceae (lobodnjače)
Ukupno polena korova		0	0	0	0	0	0	0	0
Sedmično variranje polena		167	114	105	99	96	94	134	809
UKUPNO pol. zr/m³									809

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)						
POLENSKA SKALA	drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod		
X niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba	
XX umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba	
XXX visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba	
XXX jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba	

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergičnih biljaka.