

MJERNA STANICA: Stari Grad

PERIOD: 11.08. - 17.08.2017.

Koncentracija polena:

Tokom protekle sedmice na MS Stari Grad konstatovano je 320 pol. zr/m³. Polen pripada skupini trava i korova. Procentualna zastupljenost polena u zraku je iznosila: Poaceae (51,25%), Urticaceae (27,19%), Asteraceae (6,25%), Plantaginaceae (6,25%), Rumex (5,63%) i Chenopodiaceae (3,44%).

TREND POLENA

Tokom protekle sedmice konstatovane su niske, umjerene do visoke koncentracije polena alegenih biljaka (320 pol. zr/m³ zraka) i to: trava (visoka koncentracija) i korova (umjerena koncentracija).

Polen polen trava i korova je jak alergen (vidi Polen kalendar i brošuru: Alergene biljke Kantona Sarajevo).

Visoke koncentracije polen utvrđene su 16.08. (srijeda), a najmanje koncentracije polena utvrđene su u ponedjeljak (11.08).



DRVEĆE

0 zr/m³



TRAVE

164 zr/m³



KOROVI

156 zr/m³



Urticaceae (korovi)





Poaceae (trave)



Variranje koncentracije polena tokom (zr/m³) u toku sedmice

% udio polena alergernih biljaka



Prognoza, savjeti i preporuke:

Variranje koncentracije polena je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Praćenjem trenda proteklih sedmica i uvidom u Polenski kalendar tokom naredne sedmice očekuje se visoke koncentracije polena trava i korova.

Osobama koje su alergične na polen trava i korova preporučuje se što duži boravak u šumskim ekosistemima, tokom ljetnog i ranojesenjeg perioda.

EVIDENCIJA KONCENTRACIJE POLENA									
	Dan	Pet	Sub	Ned	Pon	Uto	Sri	Čet	Ukupno
	Datum	11.08.	12.08.	13.08.	14.08.	15.08.	16.08.	17.08.	zr/m ³
DRVEĆE									
Acer (javor)		.	.	.	.	.	.	.	.
Aesculus (divlji kesten)		.	.	.	.	.	.	.	.
Alnus (joha)		.	.	.	.	.	.	.	.
Betula (breza)		.	.	.	.	.	.	.	.
Carpinus (grab)		.	.	.	.	.	.	.	.
Castanea (pitomi kesten)		.	.	.	.	.	.	.	.
Coryllus (lijeska)		.	.	.	.	.	.	.	.
Fagus (bukva)		.	.	.	.	.	.	.	.
Fraxinus (jasen)		.	.	.	.	.	.	.	.
Juglans (orah)		.	.	.	.	.	.	.	.
Pinaceae (borovi)		.	.	.	.	.	.	.	.
Platanus (platan)		.	.	.	.	.	.	.	.
Populus (topola)		.	.	.	.	.	.	.	.
Quercus (hrast)		.	.	.	.	.	.	.	.
Salix (vrba)		.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus (zova)		.	.	.	.	.	.	.	.
Tax/Jun (tisa/čempres)		.	.	.	.	.	.	.	.
Tilia (lipa)		.	.	.	.	.	.	.	.
Ulmus (brijest)		.	.	.	.	.	.	.	.
Ukupno polena drveća		0	0	0	0	0	0	0	0
TRAVE									
Poaceae (trave)		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	164
Cyperaceae (šišaševi)		.	.	.	.	.	.	.	.
Ukupno polena trava		24	23	19	26	22	29	21	164
KOROVI									
Ambrosia (ambrozija)		.	.	.	.	.	.	.	.
Artemisia (pelin)		.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex (kiselica)		X	X	.	.	.	X	X	18
Urticaceae (žare)		XX	X	XX	XX	X	XX	XX	87
Asteraceae (glavočike)		.	X	X	X	X	.	X	20
Plantaginaceae (bokvice)		X	X	.	.	.	X	X	20
Chenopodiaceae (lobodnjače)		.	X	.	.	.	X	X	11
Ukupno polena korova		18	26	18	18	12	30	34	156
Sedmično variranje polena		42	49	37	44	34	59	55	320
UKUPNO pol. zr/m ³									

KONCENTRACIJA POLENA (zr/m ³)						
POLENSKA SKALA			drveće	trave	korovi	Simptomi alergije se javljaju kod
X	niska koncentracija	1-25	1-15	1-5	1-10	izuzetno osjetljivih osoba
XX	umjerena koncentracija	26-50	16-90	6-20	11-50	puno alergičnih osoba
XXX	visoka koncentracija	51-75	91-1500	21-200	51-500	većine alergičnih osoba
XXXX	jako visoka koncentracija	više od 75	više od 1500	više od 200	više od 500	svih alergičnih osoba

Forsyth County Environmental Affairs department, Pollen Rating Scale (PRS).

<http://www.co.forsyth.nc.us/EAP/pollen.aspx>

NAPOMENA:

- ✓ u periodu visokih koncentracija polena, preporučujemo šetnje u jutarnjim ili kasnim satima, te nakon kišnih padavina (koncentracija polena je niska),
- ✓ osobama osjetljivim na polen, preporučujemo kraće boravke u prirodi (parkovima), posebno za vrijeme visokih dnevnih temperatura, vjetera i sunčanih dana,
- ✓ izbjegavati šetnje u periodu od 11:00 do 16:00 sati,
- ✓ u slučaju otežanih disanja, kihanja, suženja očiju i nosa, obratiti se ljekaru. Uzimati što više tečnosti, umivati se mlakom vodom, jačati imuni sistem organizma unoseći dovoljne količine vitamina i minerala,
- ✓ u cilju preventivnog djelovanja redovno pratiti izvještaje o koncentraciji polena alergeni biljaka.